

Mesures d'hygiène  
lors de la manipulation  
de **BRAVECTO**<sup>®</sup>  
**spot-on** chat

**BRAVECTO®** – notre médicament vétérinaire pour le traitement d'une infestation de tiques et de puces chez les chiens et les chats avec une efficacité de 12 semaines\* – est sur le marché depuis bientôt 7 ans.

En tant qu'entreprise pharmaceutique de recherche pour les médicaments vétérinaires, nous travaillons constamment au développement de nos produits et services: aujourd'hui, nous souhaitons vous informer que **BRAVECTO® spot-on** chat est livré avec des emballages actualisés.

Pour faciliter l'utilisation, nous avons équipé **BRAVECTO® spot-on** chat d'une pipette innovante. Nous avons reçu très occasionnellement des rapports indiquant que les propriétaires d'animaux avaient mal compris sa manipulation. Dans quelques rares cas, en raison d'une mauvaise utilisation de la pipette, la substance s'est déversée sur les doigts du propriétaire de l'animal.

Afin d'éviter tout contact avec le médicament vétérinaire en cas d'utilisation incorrecte de la pipette, des mesures d'hygiène pratiques ont été intégrées dans les informations cliniques du médicament. Ainsi, des gants d'hygiène doivent être portés lors de l'application de **BRAVECTO® spot-on** chat. Ce sont de simples précautions pour éviter tout contact cutané de l'utilisateur avec le produit. La substance spot-on est conçue pour adhérer de manière fiable au pelage ou à la peau de l'animal afin d'assurer une protection efficace.

Veillez noter les instructions d'utilisation suivantes lors de l'application de **BRAVECTO® spot-on** chat:



<https://www.vetpharm.uzh.ch/TAK/06000000/00065873.07>

Comme service, nous vous proposons des gants d'hygiène, que vous pouvez commander auprès de notre service client ou de votre représentant commercial lorsque vous commandez le **BRAVECTO® spot-on** chat.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter notre service client ou votre représentant commercial à tout moment.

Avec nos meilleures salutations, **vosre MSD Animal Health**

\* **Bravecto® solution pour application cutanée pour les chats:** activité insecticide immédiate et persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) et les tiques (*Ixodes ricinus*) pendant 12 semaines. Traitement des infestations par des mites d'oreilles (*Otodectes cynotis*).

**Bravecto® spot-on ad us. vet.,** Solution pour application cutanée. **Substance active:** Fluralaner 280 mg/ml. **Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles:** Traitement des infestations par les puces et les tiques chez les chats. Ce médicament vétérinaire est un insecticide et un acaricide systémique qui assure une activité insecticide persistante sur les puces (*Ctenocephalides felis*) et une activité acaricide persistante sur les tiques (*Ixodes ricinus*) pendant 12 semaines. Afin d'être exposées à la substance active, les puces et les tiques doivent être présentes sur l'animal et avoir commencé à se nourrir. L'effet sur les puces débute dans les 12 heures (*C. felis*) et dans les 48 heures pour les tiques (*I. ricinus*). **Bravecto® spot-on** peut être utilisé dans le cadre d'un plan de traitement de la dermatite allergique par piqûres de puces (DAPP). Traitement des infestations par les acariens (*Otodectes cynotis*). **Contre-indications:** Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à un autre composant. **Mises en garde particulières à chaque espèce cible:** Pour pouvoir être exposés au fluralaner, les parasites doivent avoir commencé à se nourrir sur l'animal; par conséquent, le risque de transmission de maladies d'origine parasitaire ne peut être exclu. **Précautions particulières d'emploi:** **Précautions particulières d'emploi chez l'animal:** En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chatons âgés de moins de 9 semaines et/ou chez les chats dont le poids est inférieur à 1,2 kg. Le produit ne doit pas être administré à moins de 8 semaines d'intervalle, car l'innocuité pour des intervalles plus courts n'a pas été testée. S'assurer que le contenu de la pipette ou la dose appliquée n'entre pas en contact avec les yeux de l'animal traité ou d'autres animaux. Ne pas administrer aux lésions cutanées. **Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:** Tout contact avec le produit doit être évité, les gants de protection jetables obtenus avec ce produit sur le point de vente doivent être portés lors de la manipulation et de l'administration du produit pour les raisons suivantes: Des réactions d'hypersensibilité ont été reportées chez un petit nombre de personnes, et peuvent potentiellement être graves. Les personnes présentant une hypersensibilité au fluralaner ou à l'un des excipients doivent éviter toute exposition au produit. Le produit colle à la peau et peut également coller aux surfaces après le déversement du produit. Des éruptions cutanées, des picotements ou des engourdissements ont été signalés chez un faible nombre d'individus après contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau et du savon. Dans certains cas, le savon et l'eau ne suffisent pas pour enlever le produit des doigts. Un contact avec le produit peut également se produire lors de la manipulation de l'animal traité. Assurez-vous que le site d'application de votre animal n'est plus apparent avant un nouveau contact avec le site d'application. Cela inclut câliner l'animal ou partager un lit avec l'animal. Il faut jusqu'à 48 heures pour que le site d'application soit sec, mais il sera visible plus longtemps. En cas de réactions cutanées, consulter un médecin et lui montrer la notice d'emballage du produit. Les personnes ayant une hypersensibilité cutanée ou une allergie connue à d'autres médicaments vétérinaires de ce type doivent manipuler le médicament vétérinaire ainsi que les animaux traités avec prudence. Ce produit peut causer une irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer minutieusement immédiatement à l'eau. Ce produit est nocif après ingestion. Conserver le produit dans le conditionnement d'origine jusqu'à utilisation, afin d'éviter que les enfants aient un accès direct au produit. Tout applicateur usagé doit être jeté immédiatement. En cas d'ingestion accidentelle, demandez conseil à un médecin et lui montrer la notice d'emballage. Le produit est hautement inflammable. Conserver à l'écart de toute source de chaleur, source d'étincelles, flamme ou autres sources d'inflammation. En cas de déversement, par exemple sur la table ou sur le sol, retirer l'excédent de produit à l'aide d'un mouchoir en papier et nettoyer la surface avec un détergent. **Effets indésirables (fréquence et gravité):** Dans les études cliniques, de légères réactions cutanées transitoires telles qu'érythème, prurit ou alopecie ont été fréquemment observées au site d'application (chez 2,2 % des chats traités). Les symptômes suivants ont également été observés peu après l'application: apathie, tremblements, anorexie (0,9 % des chats traités) ou vomissements, pyalisme (0,4 % des chats traités). **Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte:** L'innocuité du médicament chez les reproducteurs ainsi que chez les chattes gravides ou allaitantes n'a pas été démontrée. N'utiliser qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque par le vétérinaire traitant. **Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions:** Aucune connue. Le fluralaner est fortement lié aux protéines plasmatiques. Cela peut entraîner une compétition avec les autres molécules fortement liées aux protéines plasmatiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et les dérivés de la coumarine (warfarine). L'incubation de fluralaner avec du carprofène ou de la warfarine dans du plasma de chien aux concentrations maximales attendues dans le plasma n'a pas réduit la liaison du fluralaner, du carprofène ou de la warfarine avec les protéines plasmatiques. Lors des essais laboratoires et cliniques terrain, aucune interaction n'a été observée entre Bravecto® spot-on et des médicaments vétérinaires utilisés de façon routinière. **Posologie et voie d'administration:** Solution pour application cutanée. Bravecto® spot-on doit être administré correspondant à une dose de 40 - 94 mg de fluralaner/kg de poids corporel. Pour les chats de plus de 12,5 kg, utiliser l'association de deux applicateurs qui se rapproche le plus du poids corporel. **Temps d'attente:** Sans objet. **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:** MSD Animal Health SARM, Lucerne. **Catégorie de remise:** B. **Informations complémentaires:** Voir notice d'emballage ou sous [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

Protégé par le droit d'auteur © 2022 Intervet International B.V., une filiale du groupe Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Tous droits réservés.  
MSD Animal Health GmbH, Werftstrasse 4, CH-6005 Lucerne, [www.msd-animal-health.ch](http://www.msd-animal-health.ch)  
CH-BRV-220100001

**BRAVECTO®**

 **MSD**  
Animal Health